



REPRIEVE

Existe un vínculo entre el VIH y las enfermedades cardíacas.

- ♥ Los estudios han demostrado que las personas que viven con el VIH tienen entre 50 y 100 % más de probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares (entre ellas, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular) que los individuos sin el VIH.
- ♥ REPRIEVE es un estudio clínico que investiga la prevención de largo plazo de enfermedades cardíacas entre las personas infectadas con el VIH.

Prevención de enfermedades cardíacas

REPRIEVE evaluará si una dosis diaria de pitavastatina reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con el corazón entre los individuos infectados con el VIH.

La pitavastatina es una estatina aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Las estatinas se usan para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas.

Sobre la base de información actual, se considera que la pitavastatina puede usarse sin riesgo en todos los tratamientos antirretrovirales prescritos por un médico.



Beneficios del estudio REPRIEVE para minimizar el riesgo

Todos los participantes recibirán orientación sobre medidas para mejorar la salud cardíaca, entre ellas:

-  Realizar un tratamiento antirretroviral.
-  Mantener el colesterol, la presión arterial y el nivel de azúcar en sangre dentro de rangos favorables.
-  No fumar.
-  Alimentarse bien.
-  Hacer ejercicio.

Pero se necesita una investigación de largo plazo para estrategias de prevención de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares específicas para el VIH.

Obtener más información sobre la prevención de enfermedades cardíacas entre las personas infectadas con el VIH

QUÉ NECESITA SABER SOBRE EL ESTUDIO REPRIEVE



DURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

48 meses en promedio



COMPROMISO SENCILLO DE TIEMPO

Consultas alrededor de **3** veces al año



HAY UN CENTRO CERCA SUYO

USTED PUEDE SER SELECCIONADO PARA PARTICIPAR SIEMPRE QUE REÚNA LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- ☒ Tener entre 40 y 75 años, y estar infectado con el VIH.
- ☒ Haber recibido tratamiento antirretroviral (ART, por sus siglas en inglés), al menos, durante 6 meses antes de comenzar el estudio.
- ☒ No tener antecedentes de enfermedades cardiovasculares (tales como ataque cardíaco o accidente cerebrovascular).
- ☒ No estar tomando actualmente una estatina.

Obtenga más información sobre el estudio REPRIEVE y cómo inscribirse:
www.reprievetrial.org

La participación en el estudio REPRIEVE no se trata simplemente de "agregar otro comprimido más," sino de abrir el camino para lograr corazones más sanos para la comunidad de personas infectadas con el VIH.

Ayude a que la comunidad se entere del estudio clínico REPRIEVE:



Llame al: 1-877-29-HEART



facebook.com/reprievetrial



[@reprievetrial](https://twitter.com/reprievetrial)



El estudio REPRIEVE es financiado principalmente por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (National Heart Lung and Blood Institute o NHLBI), que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health o NIH), y respaldado por la Oficina de Investigaciones sobre el SIDA (Division of AIDS o DAIDS) de los NIH, y utiliza el Grupo de Estudios Clínicos sobre el SIDA (AIDS Clinical Trials Group o ACTG) y otras redes de estudios clínicos.